Vertissements ® agricoles



Grandes cultures

Le 3 Décembre 1991

N° 15

CEREALES

Mouche grise: Risque faible. Pucerons: A surveiller. Cicacelles: Vigilance très localement.

CEREALES

MOUCHE GRISE

l'arrachage.

7 prélèvements de terre ont été effectués courant Octobre sur betteraves avant

Les analyses ont été réalisées par le Laboratoire de LOOS-EN-GOHELLE (S.R.P.V. NORD - PAS-DE-CALAIS).

RESULTATS DES COMPTAGES D'OEUFS DE MOUCHE GRISE

COMMUNES	Nbre d'oeufs viables	Risque	
COGNAT-LYONNE (03) ESCUROLLES (03) USSEL-D'ALLIER (03)	60 000 0 570 000	Faible Nul Faible	
ARTONNE (63) LEMPDES (63) RIOM (La Croix des 3 Mains) (63) THURET (63)	0 0 250 000 320 000	Nul Nul Faible Faible	

Ces résultats confirment que le risque Mouche grise est très faible.

PUCERONS ET J.N.O.

Situation

- En cultures : L'activité est pratiquement nulle. 2 à 3 % de pieds infestés au maximum.

Préconisation

Aucune intervention ne se justifie. Maintenir une surveillance dès qu'une période douce survient.

- N° de série : 792
- SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX RN 89 Marmilhat 63 370 LEMPDES

- PUBLICATION MENSUELLE
- Directeur-Gérant : B . MORIN
- CPPAP.N°2315 AD Abonnement Annuel:
- Chèques : Régie de recettes D.R.A.F.
- _ Imprimerie D. R. A. F.

CICADELLES ET PIEDS CHETIFS

O Situation

Les captures en cuvettes jaunes sont quasi nulles depuis début Novembre.

	POSTES	11/11 au 17/11	18/11 au 24/11	25/11 au 01/12
14	SAULCET	0	0	0
Sid ,	SAULZET	2	0	0
	LES PRADEAUX	0	0	0
FDGCEC NI	BOURBON-L'AR.	0	0	0
	NEUVY	0	0	0
	COUZON	0	0	0

En cultures, localement au cours des belles journées ensoleillées de la semaine dernière, une petite activité est notée <u>surtout en bordure de parcelles</u> (Sud Allier).

O Préconisation

Le risque est très faible.

Afin de détecter Psammotettix alienus (cicadelle brune) : visiter vos parcelles l'après-midi, par beau temps (ensoleillé et calme, température supérieure à 15°).

ATTENTION: De nombreuses cicadelles vertes sont parfois présentes (non nuisibles).

Les secteurs les plus exposés où une surveillance doit être maintenue par beau temps et avant une forte gelée :

- Zones où des dégâts ont été observés les 2 années précédentes.
- Parcelles bien orientées au Sud.
- Proximité de haies, bosquets, friches...

A cette époque, les cicadelles (3ème génération vieillissante) ne sont plus capables de grands déplacements.

En cas de <u>présence uniquement</u>, une intervention très locale peut se justifier.

PRODUITS EN A.P.V.:

- FASTAC 0,21/ha - SUMI ALPHA 0,25 1/ha